

Standard-Arbeitsanweisung Rettungsdienst (SAA) – Medikamente

„Nalbuphin“

Ärztliche Leitung Rettungsdienst Landeshauptstadt Magdeburg
Stand 12/2020

Nächste geplante Überarbeitung Juni 2021

Indikationen /Symptome:

- starker Schmerz (NRS > 5) bei Personen älter als 1,5 Jahren

Kontraindikationen:

- Allergie bzw. Unverträglichkeit gegen Nalbuphin
- Gleichzeitige Behandlung mit μ -Agonisten (Morphin, Fentanyl, Targin, Oxycodon, Hydromorphon, Tramadol, etc.)
- Schwere Leber- und Niereninsuffizienz
- Anwendung während der Geburt

Notarzttruf:

- Bei zusätzlichem ABCDE-Problem
- Insuffizienter Schmerztherapie

Alternativen:

- Lagerung
- Ruhigstellung
- Kühlung

Aufklärung/Einwilligung:

- Nach BPR „Aufklärung“

Risiken / CAVE / Hinweise / mögliche UAW:

- Schläfrigkeit, Dysphorie
- Atemdepression
- Übelkeit, Erbrechen

Durchführung:

- initial langsam 0,1 mg/kg KG i. v.
- Wartezeit 5 Min.
- Falls NRS weiter > 5: einmalige Wiederholung 0,1 mg/kg KG i.v.
- Maximaldosis 0,2 mg/kg KG bzw. 20 mg

Erfolgsprüfung:

- Analgetische Wirkung messen
- Dokumentation NRS **vor** und **nach** Nalbuphin-Gabe

Verlaufskontrolle:

- Erhebung Schmerzstärke (NRS)
- Re-Evaluation ABCDE